


## Onderzoek onder mensen met colitis ulcerosa De invloed van infliximab, ciclosporine of operatie op de kwaliteit van leven

Methode Er zijn 4500 online vragenlijsten uitgezet. In totaal hebben 1218 mensen deze vragenlijst ingevuld. 871 mensen hadden colitis ulcerosa en waren om die reden geschikt voor deelname aan dit onderzoek.

De respons is 27,1%. Deze respons is voldoende groot.

871 personen hebben cu. Welke medicijnen gebruiken deze mensen?



### Infliximab

Een kwart van de respondenten gebruikt infliximab.

64% gebruikt infliximab **langer** dan een half jaar.

De helft van deze mensen heeft geen last van bijwerkingen.

### Ciclosporine


Slechts 21 mensen (2%) gebruikt ciclosporine.

81% gebruikt dit middel **korter** dan een half jaar.

Bijna alle mensen hadden last van bijwerkingen.

### Operatie


43 mensen hebben een stoma, 39 mensen hebben of krijgen binnenkort een pouch en 19 mensen hebben een ander soort darmoperatie ondergaan.




Indien de colitis zich in de **hele** dikke darm bevindt, betekent dit dat men ernstig ziek is. Vrijwel alleen mensen met een pancolitis komen in aanmerking voor een operatie.

### Kwaliteit van leven


#### Algemeen welbevinden




#### Energieniveau



#### Deelname sociale activiteiten



#### Deelname werk/school



123 mensen gebruiken nog steeds infliximab. 93 mensen hebben geen klachten meer en 36 mensen zijn gestopt omdat infliximab niet effectief genoeg bleek.

Niemand uit de respondentengroep gebruikt nog ciclosporine. Het effect is met name van korte duur.

In dit onderzoek is niet gevraagd naar de psychische belasting van het hebben/krijgen van een stoma of pouch.

### Conclusie

Het gebruik van infliximab lijkt een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van leven.  
In het geval van een volledige ontstoken darm, is operatie zinvol. De kwaliteit van leven wordt aanzienlijk verbeterd.